BC Prenatal Genetic Screening Program

رحلات الفحص

(هيئات الصحة في فريزر، المنطقة الداخلية، جزيرة وساحل فانكوفر)

ما هو الخيار الأفضل بالنسبة لك؟

النساء/الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 35 عام

الموجات فوق الصوتية

فحص الدم

أفضل وقت لإجراء فحص الموجات فوق الصوتية وفحص الدم المتكامل في مصل الدم قبل الولادة (SIPS)

11 إلى 13 أسبوع	الفحص التاريخي بالموجات فوق الصوتية
9 إلى 13 أسبوع	فحص الدم الأول *
14 إلى 16 أسبوع	فحص الدم الثاني
19 إلى 21 أسبوع	الفحص التاريخي بالموجات فوق الصوتية

* يمكن إجراء سحب الدم بناءً على تاريخ آخر دورة شهرية

النساء/ الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 35 عاماً أو أكثر والذين لديهم حمل توأم

الموجات فوق الصوتية



فحص الدم

أفضل وقت لإجراء فحص الموجات فوق الصوتية وفحص الدم المتكامل قبل الولادة (IPS)

8 إلى 10 أسابيع	الفحص التاريخي بالموجات فوق الصوتية
9 إلى 13 أسبوع	فحص الدم الأول
11 إلى 13 أسبوع	الموجات فوق الصوتية لمتلازمة داون
14 إلى 16 أسبوع	فحص الدم الثاني
19 إلى 21 أسبوع	الموجات فوق الصوتية التفصيلية

النساء/ الأفراد الذين لديهم أول موعد بعد 14 أسبوع من الحمل

الموجات فوق الصوتية

فحص الدم

أفضل وقت لإجراء فحص الموجات فوق الصوتية وفحص الدم الرباعي

بعد الموعد الأول	الفحص التاريخي بالموجات فوق الصوتية
14 إلى 21 أسبوع	فحص دم واحد
19 إلى 21 أسبوع	الموجات فوق الصوتية التفصيلية

النساء/ الأفراد الذين يختارون عدم إجراء فحص متلازمة داون

الموجات فوق الصوتية

أفضل وقت للموجات فوق الصوتية فقط

11 إلى 13 أسبوع	الفحص التاريخي بالموجات فوق الصوتية
19 إلى 21 أسبوع	الموجات فوق الصوتية التفصيلية

يجب إكمال استمارة طلب المختبر لكل عملية سحب دم:
https://cms.psbchealthhub.ca/sites/default/files/2023-09/PGSLabReq.pdf

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة هذا الموقع الإلكتروني:
https://www.psbchealthhub.ca/screening-programs

Perinatal Services BC
Provincial Health Services Authority

Revised Apr 2025
[Arabic]