Parcours de dépistage

(Fraser, Interior, Island & Vancouver Coastal Health)

BC Prenatal Genetic Screening Program

Quelle option vous convient le mieux?

Femmes/personnes de moins de 35 ans

ÉCHOGRAPHIE



TEST SANGUIN

Meilleur moment pour l'échographie et le test sanguin SIPS

11–13 semaines	Échographie de datation
9–13 semaines	Premier test sanguin*
14–16 semaines	Deuxième test sanguin
19–21 semaines	Échographie détaillée

* La prise de sang peut être effectuée en se basant sur la datation selon la date des dernières règles.

Femmes/personnes âgées de 35 ans ou plus et celles ayant des grossesses gémellaires

ÉCHOGRAPHIE



TEST SANGUIN

Meilleur moment pour l'échographie et le test sanguin IPS

8–10 semaines	Échographie de datation
9–13 semaines	Premier test sanguin
11–13 semaines	Échographie pour syndrome de Down
14–16 semaines	Deuxième test sanguin
19–21 semaines	Échographie détaillée

Femmes/personnes dont le premier rendez-vous a lieu après 14 semaines de gestation

ÉCHOGRAPHIE



TEST SANGUIN

Meilleur moment pour l'échographie et le test sanguin Quad

Après premier rendez-vous	Échographie de datation
14–21 semaines	Un test sanguin
19–21 semaines	Échographie détaillée

Femmes/individus qui choisissent de ne pas avoir de test de dépistage du syndrome de Down

ÉCHOGRAPHIE

Meilleur moment pour l'échographie seulement

11–13 semaines	Échographie de datation
19–21 semaines	Échographie détaillée

Une ordonnance de laboratoire est requise pour chaque prélèvement sanguin:
https://cms.psbchealthhub.ca/sites/default/files/2023-09/PGSLabReq.pdf

Pour plus d'informations, consultez le site Web:
https://www.psbchealthhub.ca/screening-programs

Perinatal Services BC
Provincial Health Services Authority

Révisé avril 2025