Trayectorias de pruebas de detección

(Fraser, Interior, Island y Vancouver Coastal Health)

¿Qué opción es la mejor para usted?

BC Prenatal Genetic Screening Program

Mujeres/personas menores de 35 años

ECOGRAFÍA

ANÁLISIS DE SANGRE

Mejor momento para la ecografía y el análisis de sangre SIPS

11–13 semanas	Ecografía de datación
9–13 semanas	Primer análisis de sangre*
14–16 semanas	Segundo análisis de sangre
19–21 semanas	Ecografía detallada

* La extracción de sangre se puede realizar según la datación de la Fecha de la Última Menstruación

Mujeres/personas de 35 años o más y aquellas con embarazos de gemelos

ECOGRAFÍA

ANÁLISIS DE SANGRE

Mejor momento para la ecografía y el análisis de sangre IPS

8–10 semanas	Ecografía de datación
9–13 semanas	Primer análisis de sangre
11–13 semanas	Ecografía para síndrome de Down
14–16 semanas	Segundo análisis de sangre
19–21 semanas	Ecografía detallada

Mujeres/personas cuya primera cita es después de las 14 semanas de gestación

ECOGRAFÍA

ANÁLISIS DE SANGRE

Mejor momento para la ecografía y el análisis de sangre Quad

Después de la primera cita	Ecografía de datación
14–21 semanas	Un análisis de sangre
19–21 semanas	Ecografía detallada

Mujeres/personas que eligen no realizarse la prueba de detección del síndrome de Down

ECOGRAFÍA

Mejor momento solo para la ecografía

11–13 semanas	Ecografía de datación
19–21 semanas	Ecografía detallada

Se requiere una solicitud de laboratorio completa para cada extracción de sangre:
https://cms.psbchealthhub.ca/sites/default/files/2023-09/PGSLabReq.pdf

Para más información, consulte el sitio web:
https://www.psbchealthhub.ca/screening-programs

Perinatal Services BC
Provincial Health Services Authority

Revised Apr 2025
[Spanish]